A.S.L. TO4
Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)
Tel. +39 011.9176666
Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)
Tel. +39 0125.4141
www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

Dipartimento di Prevenzione /S.C. Igiene e Sanità Pubblica/FV
S.S. Sorveglianza Malattie infettive e Vaccinazioni /M.T.G
Sede Via Regio Parco, 64 10036 Settimo T.se
Nr. Telefono 011/8212308
Nr. Fax 011/8212307
E-mail sisp.settimo@aslto4.piemonte.it
Pec:direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it

Settimo T.se, 24/01/2020
Prot. Nr. 0007831
CLASS. 6.2.1

Al Dirigente Scolastico
dell' Isituto Comprensivo
G. Rodari di Brandizzo

E-mail: toic85300x@istruzione.it

Oggetto: Ossiuriasi - misure di profilassi

A seguito della sua segnalazione relativa alla presenza di casi di ossiuriasi in bambini che frequentano la Scuola dell'Infanzia di Brandizzo plesso Montessori si riportano alcune informazioni e misure di profilassi importanti al fine di ridurre il contagio.

L' ossiuriasi è causata da un nematode denominato ENTEROBIUS VERMICULARIS e causa prurito anale anche se in alcune persone i sintomi possono essere assenti.

L'incidenza è più diffusa nei bambini di età scolare e prescolare.

Le vie di trasmissione sono diverse, la principale è quella oro-fecale per ingestione, in cui le uova sono trasportate con le mani su giocattoli, lenzuola, vestiti.

E' possibile che l'infezione venga trasmessa con la polvere nelle case e nelle comunità dove la contaminazione può essere massiccia.

Le uova possono sopravvivere nell'ambiente anche per due settimane.

MISURE DI PROFILASSI IN CASO DI OSSIURIASI

- Cambiare le lenzuola e gli indumenti quotidianamente e lavarli ad una temperatura superiore a 55 gradi;

- lavarsi le mani prima di mangiare;

- le persone infettate dovranno effettuare dei bagni ogni mattina preferendo la doccia;

- effettuare frequenti cambi di biancheria, pigiami e lenzuola;

- pulire accuratamente tutte le superfici lavabili della scuola, in particolare i bagni, i giocattoli e le brandine;

- informare i genitori di tutti i bambini che frequentano la scuola materna sulla presenza dei casi e sulla necessità di rivolgersi al proprio Pediatra nel caso in cui compaiano i sintomi relativi all'infestazione (principalmente:prurito perianale, disturbi del sonno, irritabilità);

- divulgare le soprastanti misure di profilassi ai genitori di tutti i bambini che frequentano la scuola materna per l'applicazione delle stesse anche in ambito familiare.

Cordiali saluti.

Il Responsabile
S.S. Sorveglianza
Malattie infettive e Vaccinazioni

Dott.ssa Maria Teresa Galati

MTG/am